

DAFALGAN GEBRUIK[®] TIJDENS JOUW OPNAME

Omdat we op de PAAZ vaak werken met mensen die lijden aan een verslavingsproblematiek of met mensen die reeds verschillende geneesmiddelen nemen, is Dafalgan[®] bij ons niet vrij verkrijgbaar. Dafalgan[®] wordt op onze afdeling enkel gegeven op voorschrift van de arts. Ieder meegebracht geneesmiddel dient bij het begin van de opname aan de verpleging te worden bezorgd. Dus ook Dafalgan[®] of andere vrij verkrijgbare medicatie, net zoals vitaminepreparaten of zalven geef je aan de verpleging tot bij jouw ontslag. Wanneer je tijdens het weekend thuis verblijft, is het eveneens de afspraak dat zolang je in opname bent, je thuis geen extra medicatie bijneemt. Dit brengt jouw veiligheid of jouw opname in het gedrang. In dit ziekenhuis hechten wij veel belang aan veiligheid en communicatie. Wanneer je vragen hebt over jouw medicatie of andere producten die je wenst te nemen, kan je dit best bespreken met jouw arts.

VRAGEN

Wanneer je vragen hebt betreffende jouw behandeling, bespreek je dit best met jouw arts.


Contactgegevens:

Afdelingspsychiaters Tel. 011 71 57 00
Dr.Sven Estercam
Dr.Gert Neirinck
Dr.Eva Vansummeren

Hoofdverpleegkundige Tel: 011 71 57 06
Kristof Vandingenen

Algemene contactgegevens PAAZ
Tel: 011 71 57 00

Publicatie: Oktober 2023, team PAAZ
Sint-Franciscusziekenhuis
P. Paquaylaan 129 - 3550 Heusden-Zolder
Tel.: 011 71 50 00 - Fax.: 011 71 50 01 - www.sfz.be



Dafalgan[®]
paracetamol NIET zomaar
een pijnstiller

WAT IS DAFALGAN[®]?

Dafalgan[®] is een merknaam van een pijnstiller op basis van paracetamol. Er bestaan verschillende soorten Dafalgan[®], zoals tabletten, bruistabletten of smelt - tabletten in doseringen van 500mg tot 1g. Al deze vormen zijn in de apotheek te verkrijgen zonder voorschrift. Er zijn ook pijnstillers op basis van paracetamol in combinatie met een andere pijnstillende stof zoals bijvoorbeeld aspirine of codeïne. Dafalgan Codeïne[®] is enkel op voorschrift verkrijgbaar omdat dit een zwaarder pijnstillend middel is met een risico op verslaving.

WANNEER DAFALGAN[®] GEBRUIKEN?

Dafalgan[®] wordt door een arts voorgeschreven voor pijnstilling of koorts. Het is belangrijk dat je tussen twee innamen minstens 4 uur laat en nooit meer dan 1g gelijktijdig neemt. Dit heeft te maken met de verwerking van de pijnstiller door de lever.

Ondanks dat Dafalgan[®] een bekend en veelgebruikt middel is, is het niet zonder gevaar. Dagelijks gebruik van (veel) paracetamol kan schadelijke gevolgen hebben voor jouw nieren of lever. Daarom bedraagt de maximale dosis Dafalgan[®] per dag 4g. Grote hoeveelheden Dafalgan[®] ineens innemen kan ervoor zorgen dat de lever dit moeilijk verwerkt en een vergiftiging optreedt.

Hoewel Dafalgan[®] vrij verkrijgbaar is, is dit nog steeds een geneesmiddel waar voorzichtig mee moet worden omgesprongen.

WANNEER DAFALGAN[®] VERMIJDEN?

Als je lijdt aan een aandoening van de nieren of lever kan je het gebruik van Dafalgan[®] best tot een minimum beperken, met een maximum van 3g Dafalgan[®] per dag. Het gebruik van Dafalgan[®] in combinatie met kalmeermiddelen, middelen tegen epilepsie en alcohol dient met jouw arts besproken te worden. Bij een zoutarm dieet, kan je best geen Dafalgan[®] bruistabletten gebruiken omdat deze zout bevatten. Indien je hier verdere vragen over hebt, kan je deze bij jouw behandelend arts stellen.

Dafalgan[®] en alcoholgebruik.

De combinatie van pijnstillers en alcohol is af te raden. Zowel overmatig alcoholgebruik als het gebruik van alcohol op geregelde basis, kunnen lijden tot beschadiging van de lever.