
SINT-FRANCISCUS ZIEKENHUIS
aan jouw zijde!




ZENUWWORTELINFILTRATIE

Brochure voor patiënt(e) & familie

Wat is een zenuwwortelinfiltratie?

Rond de pijnlijke zenuw wordt een lokaal verdovend product in combinatie met een ontstekingsremmer ingespoten. De plaats van de prik wordt via röntgenstralen opgezocht.



Opname voor de zenuwwortelinfiltratie

U wordt opgenomen op het pijncentrum.

Volgende documenten dient u in elk geval mee te brengen naar het ziekenhuis:

- o Identiteitskaart
- o Attesten (werkonbekwaamheid, hospitalisatieverzekering,....) waarvan u wenst dat de arts deze voor u invult
- o De vragenlijst, volledig ingevuld en ondertekend

Bij aankomst in het ziekenhuis schrijft u zich in via de kiosk in de centrale inkomhal.
Hierna mag u rechtstreeks naar het pijncentrum gaan.
U mag plaatsnemen in de wachtzaal. De verpleegkundige begeleidt u naar de omkleedruimte en zorgt voor de nodige administratie.
Vervolgens wordt u een relaxzetel toegewezen in de verblijfzaal. Indien nodig wordt door de verpleegkundige een infuus geplaatst dat de arts kan gebruiken om tijdens de behandeling medicatie toe te dienen.

Wat met medicatie?

- Indien u allergisch bent voor medicatie (o.a. antibiotica), contraststof, jodium, latex of kleefpleisters, dient u dit vooraf te melden.

- Indien u bloedverdunners inneemt, dient u dit te melden.

Mogelijke zwangerschap?

Wanneer u **zwanger** bent (of zou kunnen zijn): de röntgenstraling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Dit is een reden om de behandeling uit te stellen tot na de zwangerschap.

De behandeling

U wordt gevraagd om op de buik op de behandeltafel te liggen.
Vervolgens zoekt de arts de plek op waar de inspuitingen moeten worden geplaatst.

Het inspuiten van de medicatie (cortisone in combinatie met een lokaal verdovend product) kan soms pijn opwekken in het verloop van de zenuw (arm of been). Doofheid en eventuele krachtsvermindering van het been of de arm gedurende enkele uren is normaal.

Mogelijke problemen

De procedure is over het algemeen zeer veilig.

Algemene risico's als infectie of nabloeding zijn uiterst zeldzaam.

Nevenwerkingen van de cortisone kunnen zijn: blozen, zweten, hartkloppingen, hoofdpijn en een tijdelijke verhoging van de bloedsuikerspiegel (bij suikerzieken). De glycemie-waarden dienen dan frequenter opgevolgd te worden.

Na de behandeling

- Na de infiltratiebehandeling verblijft u nog een tijdje in de verblijfzaal voor de nodige controles.
- Meestal verblijft u in totaal 1 tot 2 uur in het pijncentrum. Als alles naar wens verloopt, mag u naar huis. U doet het de rest van die dag best rustig aan.
- Als u na de behandeling het dagziekenhuis verlaat, mag u niet zelf autorijden.

Bij abnormale pijn, roodheid, zwelling of koorts kunt u terecht bij de behandelend neurochirurg, de huisarts of de spoedafdeling.

Contactgegevens

Contactgegevens dienst neurochirurgie Sint-Franciscusziekenhuis Heusden-Zolder

Neurochirurgen

Dr. S. Vanvolsem
Dr. S. Achahbar
Dr. M. Wissels
Dr. S. Bamps
Dr. P. Donkersloot
Dr. W. Duyvendak
Dr. M. Plazier
Dr. E. Put
Dr. G. Roosen
Telefoon secretariaat : 011 71 58 92

Dr. G. Bessemans
Telefoon secretariaat: 011 71 58 93

Website

www.neurochirurgie4u.be
www.sfz.be

Adres

Dienst Neurochirurgie
Sint-Franciscusziekenhuis
Pastoor Paquaylaan 129
3550 Heusden-Zolder

Nota's

Nota's



Publicatiedatum: Mei 2021, dienst neurochirurgie
Sint-Franciscusziekenhuis
P. Paquaylaan 129 | 3550 Heusden-Zolder
Tel. 011 71 50 00 | Fax. 011 71 50 01 | www.sfz.be