

INFO NA UW ONDERZOEK

ALGEMEEN

- Voor het resultaat van het onderzoek kan u steeds de dag nadien bij de aanvragende arts terecht. Indien het onderzoek dringend is, wordt het resultaat na het onderzoek aan u meegegeven of meegedeeld aan de aanvragende arts.
- De RX-beelden kan u na het onderzoek raadplegen via PACSonWEB met behulp van uw codenummer dat u aan de RX-balie heeft meegekregen.
- Indien u vragen heeft, kunt u deze het best dadelijk na het onderzoek stellen. Als u bij thuiskomst toch nog vragen heeft of problemen ondervindt ten gevolge van het onderzoek, kunt u contact opnemen met de dienst Radiologie, uw huisarts of de dienst spoedgevallen.
- Indien u de auto zelf bestuurt dient u bij gebruik van Buscopan IV een half uurtje te wachten voor vertrek naar huis tot het product uitgewerkt is (dubbelzicht is een mogelijke bijwerking).
- We passen steeds het ALARA-principe (zo laag mogelijke stralendosis) toe in kader van stralenpreventie.
- Na het onderzoek mag u eten en drinken tenzij u nog een ander onderzoek moet ondergaan.

CONTRASTONDERZOEKEN:

Slokdarm-maag-darm onderzoeken

- Het is aangewezen om thuis extra water te drinken om de bariumvloeistof te verdunnen en de stoelgang te vergemakkelijken.
- Bij gebruik van bariumcontrast zal uw stoelgang enkele dagen bleek gekleurd zijn, dit is normaal. In geval van obstipatieproblemen kan u uw huisarts een laxeermiddel laten voorschrijven.
- Bij gebruik van telebrix gastro kunnen er mogelijks buikkrampen optreden na het onderzoek.

Cystografie

- Na het onderzoek kan u een prikkelend gevoel (pijngevoel) gewaar worden ten gevolge van het inbrengen van een blaassonde. Een beetje bloedverlies is mogelijk. Indien u te veel hinder ondervindt, kan u best contact opnemen met uw huisarts, die dan eventueel een ontsmettings- of ontstekingsremmend middel kan voorschrijven.
- Veel water drinken is aangewezen om bovenvernoemde problemen te vermijden/ verminderen.
- Indien u een allergische reactie moest vertonen (papels, huiduitslag, ademhalingsmoeilijkheden, jeuk, misselijkheid), neemt u best contact op met uw huisarts of de dienst spoedgevallen.

Onderzoeken met IV-contraststof

CT-scan onderzoek, ivp (= onderzoek van de nieren), flebografie (onderzoek van de aders)

- Het is aangewezen om extra te drinken na het onderzoek om het jodiumhoudend contrastproduct uit te plassen.
- Indien u astma heeft wordt aangeraden om na het onderzoek een half uurtje op de dienst radiologie te blijven om bij een eventuele laattijdige reactie de nodige maatregelen te treffen.
- Indien u thuis een allergische reactie (papels, huiduitslag, ademhalingsmoeilijkheden, jeuk, misselijkheid) vertoont, kan u best contact opnemen met de dienst spoedgevallen of de huisarts.
- Een lavement met telebrix gastro kan mogelijks buikkrampen geven.