

Chirurgisch Dagziekenhuis: Bijbalcyste


Geachte

U gaat vandaag het ziekenhuis verlaten na een operatie voor bijbalcyste ('epididymiscyste').

Enkele aandachtspunten:

- Hou het wondje goed proper en droog. Laat de wonde over enkele dagen controleren bij de huisarts.
- Best geen kleefverband aanbrengen. Enkele compresjes in een goed steunende onderbroek volstaan om het eventuele wondvocht op te vangen.
- De gebruikte draadjes lossen vanzelf op maar kunnen regelmatig irriteren. U mag ze daarom laten verwijderen door de huisarts na een tiental dagen.
- De eerste drie à vier weken voelt de teelbal nog gezwollen aan. Dit is een normaal verschijnsel.
- Als pijnstillers neemt u best Brufen of Voltaren bij het eten. Indien u een gevoelige maag heeft, neemt u best Dafalgan bruist (3x 1g/d). Vermijd in ieder geval Aspro (Asprine, Sedergine, Dispril, Perdolan, Aspegic, Acenterine, Asaflow, Ticlid, Plavix,...) gedurende de drie eerste weken.
- Vermijd fietsen, zware inspanningen gedurende 3 weken om een eventuele nabloeding of forse zwelling te voorkomen.
- Er wordt een controle-afspraken gemaakt voor u na twee weken indien nodig.

Ons team wenst u een spoedig herstel.



Mocht er zich toch een probleem voordoen of heeft u vragen, neem dan gerust contact op met uw huisarts of met ons secretariaat.

Contactgegevens:

Artsen:

Dr. Dilen Kurt
Dr. Stragier Jo
Dr. Tuytten Tom

De urologieverpleegkundigen:

Tel. 011 71 58 22

Secretariaat urologie:

Tel. 011 71 58 10

