

## RISICO'S & COMPLICATIES


Hoewel een gastroscopie over het algemeen een veilig onderzoek is, zijn aan het ondergaan ervan enkele risico's verbonden. Tijdens het onderzoek kan een scheurtje of gaatje in de slokdarm of maag ontstaan, perforatie genoemd. De kans op een perforatie is vooral aanwezig als de slokdarm of maag fel ontstoken is of als er een poliep of biopsie weggenomen wordt. Als er een poliep of biopsie genomen werd, is het ook mogelijk dat dit een beetje nabloedt. Als u veel bloed braakt of als er zwarte stoelgang is, kan u best contact opnemen met de huisarts of met de dienst spoedgevallen.

## CONTACTGEGEVENS

Afdeling endoscopie: 011 71 59 22  
011 71 59 21  
Afdeling inwendige ziekten 1: 011 71 52 00



## GASTROSCOPIE



## INLEIDING

Bij een gastroscopie bekijkt de arts via een soepele tube (gastroscoop) de slokdarm, de maag en de twaalfvingerige darm. Via een gastroscoop kunnen met flexibele instrumenten ook weefselstalen worden afgenomen en behandelingen worden uitgevoerd. Zo kunnen vreemde voorwerpen verwijderd worden, poliepen worden weggenomen en kunnen maagbloedingen worden gestopt. Het onderzoek wordt meestal gebruikt om de reden te achterhalen van verschillende klachten zoals: slikmoeilijkheden, misselijkheid, braken, zuurbranden, bloeding, indigestie, buikpijn en pijn op de borst.

## AANDACHTSPUNTEN

Breng een volledige medicatielijst mee ter inzage voor het onderzoek. U dient minimaal 8 uur nuchter te zijn voor het onderzoek, ook de ochtendmedicatie kan u best **NIET** innemen de dag van het onderzoek.

## HET VERLOOP VAN HET ONDERZOEK

- Tandprothese uitdoen
- De achterzijde van uw mond en keel wordt verdoofd
- Er wordt eventueel een verdovend middel ingespoten om het comfort van het onderzoek te verhogen
- U wordt op de linker zijde geïnstalleerd met een mondstuk tussen de tanden
- De scoop wordt via de mond ingebracht, er wordt u gevraagd te slikken om de scoop te laten passeren
- Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten

## NAZORG

Door de verdoving in de keel mag u 30 minuten na het onderzoek niet eten of drinken om te voorkomen dat u zich verslikt.

Als u een verdoving in de arm ingespoten kreeg, moet u 1 tot 2 uur ter plaatse blijven alvorens u naar huis kan. Dezelfde dag mag u niet met de auto rijden of andere mogelijke gevaarlijke activiteiten uitvoeren.