

# Identificatie polsbandjes

## Het gebruik van polsbandjes met identificatieklever binnen het Sint-Franciscusziekenhuis:

Sinds november 2009 zijn we in het Sint-Franciscusziekenhuis overgegaan tot het invoeren van polsbandjes voor opgenomen patiënten. Op het polsbandje wordt een patiëntenklever aangebracht met een barcode, die kan ingescand worden.

De polsbandjes zijn beschikbaar in 2 kleuren. De polsbandjes voor volwassenen en kinderen vanaf circa 10 jaar zijn wit. De polsbandjes voor de kleinere kinderen en baby's zijn lichtblauw. De patiëntenklever wordt beschermd door een doorschijnend kleefschild.

## Doelstelling tot invoering van polsbandjes in het SFZ:

- Herkenbaarheid van de patiënten
- Veiligheid (verwarde patiënten, herkennen niet geautoriseerde personen binnen het ziekenhuis, vermijden foute identificatie door inlezen patiëntenklever...)
- Multipole toepassingen van inscannen polsband voor onderzoeken, OK, ...

## Afdelingen waarvoor de polsbandjes gebruikt worden:

- Alle afdelingen in het ziekenhuis waar patiënten voor verblijf of daghospitalisatie worden opgenomen
- Voor materniteit wordt het bandje ook voor de baby's voorzien

## Aanmeten van de bandjes en bevestigen van de patiëntenklever:

- Door spoedgevallen voor de patiënten die langs spoedgevallen opgenomen worden. Ambulante patiënten krijgen geen polsbandje.
- Door de afdelingen bij het ontvangen van de patiënt op de afdeling. Hierbij is het logisch dat de verpleegkundige die de opname doet, ook verantwoordelijk is voor het aanmeten van het polsbandje met sticker.



## Plaats van bevestiging van het polsbandje:

- Bij voorkeur aan een pols, maar steeds rekening houden met de toestand van de patiënt, infusen, gips... . Indien genooddaakt, kan de enkel ook dienen.

## Bij audits blijkt dat een aanzienlijk deel van de patiënten geen polsbandje draagt, redenen hiervoor zijn:

- De patiënt verwijdert de polsband zelf tijdens zijn verblijf.
- De verpleegkundige verwijdert de polsband bij het steken van een infuus, en plaats geen nieuwe polsband.
- Voor patiënten die zeer regelmatig naar het ziekenhuis dienen te komen lijkt het moeilijk om ze telkens een polsbandje aan te meten.
- Bij baby's vallen ze dikwijls uit na een aantal dagen.
- Tijdens de opname wordt vergeten de patiënt een polsbandje aan te meten.

## Besluit:

- Gezien we als ziekenhuis een resultaat van 100% dragen van polsbandje vooropstellen, is er voor een aantal afdelingen nog werk aan de winkel.
- Door continu de aandacht te vestigen op het belang van de polsbandjes met identificatie, gecombineerd met jaarlijkse audits, willen we volgend jaar een belangrijke stap zetten in het behalen van de kwaliteitsnorm.
- Voor patiënten die zeer regelmatig naar het ziekenhuis dienen te komen lijkt het moeilijk om ze telkens een polsbandje aan te meten