

Kinder- & jeugdgeneeskunde

Aandachtspunten na circumcisie

Na een circumcisie, volg je best onderstaande raadgevingen:

- Best breng je 3x/dag Neobacitracine® zalf of Terra-cortril® zalf, naargelang het voorschrift, aan op het eikeltje en de draadjes onder de resterende voor huid gedurende 10 dagen.
- De draadjes lossen vanzelf op na een 10-tal dagen.
- Indien jouw zoontje weigert te plassen, kan je hem de eerste dagen laten plassen in bad of onder de douche
- Kort baden of douchen is toegestaan. Vermijd te gaan zwemmen en langdurig baden gedurende 10 dagen. Op deze manier voorkom je vroegtijdige loslating van de hechtingen.
- Als pijnstillers kan je Ibuprofen® of Paracetamol® geven volgens gewicht en/of leeftijd, afwisselend om de 4 uur. Gewoonlijk geven we een vorm van Ibuprofen®. Hiermee zal de zwelling sneller verdwijnen.

Ibuprofen®: Nurofen®, Perdophen®, Spidifen®

Paracetamol®: Perdolan®, Dafalgan®, Mobistix®

Ibuprofen® Nurofen®, Perdophen®, Spidifen®	Laatste toediening om	
	Volgende toediening om	
Paracetamol® Perdolan®, Dafalgan®, Mobistix®	Laatste toediening om	
	Volgende toediening om	

Mochten zich er toch problemen voordoen of heb je vragen, neem dan contact op met jouw huisarts of ons secretariaat op het nummer:

011 71 58 10.

Je kan ook terecht op de kinderafdeling op het nummer: **011 71 53 30**

Bij dringende problemen kan je steeds terecht op de dienst spoedgevallen op het nummer **011 71 55 04.**

Ons team wenst u een goede thuiskomst en uw kind een spoedig herstel toe.

