

Kinder- & jeugdgeneeskunde

Richtlijnen na een narcose


Je kind is vandaag onder narcose geweest.
Let op de volgende aandachtspunten en richtlijnen.

- Indien je kind zich duizelig of slaperig voelt, is dit ten gevolge van de narcose. Laat je kind de eerste 24 uur niet alleen.
- Leg je kind zo nodig bij je op de kamer voor 1 nacht of ga regelmatig kijken. Laat in dat geval eveneens de kamerdeur open staan.
- Wees voorzichtig en let goed op als je kind de trap moet op en aflopen.
- Laat je kind zoveel mogelijk rusten (kinderen geven vaak zelf aan wanneer ze voldoende gerust hebben).
- Schakel langzaam over op regelmatig eten. Start met lichte voeding en lichte dranken zoals pudding, yoghurt, ijs, water, bouillonsoep. Liefst geen bruisende dranken.
- Baby's krijgen eerst suikerwater en de volgende voeding een fles gewone melk. Baby's met borstvoeding mogen na hun suikerwater ook weer gewoon borstvoeding krijgen.
- Als pijnstilling kan je Ibuprofen® of Paracetamol® geven volgens gewicht en/of leeftijd, afwisselend om de 4 uur.

Ibuprofen®: Nurofen®, Perdophen®, Spidifen®

Paracetamol®: Perdolan®, Dafalgan®, Mobistix®

Ibuprofen® Nurofen®, Perdophen®, Spidifen®	Laatste toediening om	
	Volgende toediening om	
Paracetamol® Perdolan®, Dafalgan®, Mobistix®	Laatste toediening om	
	Volgende toediening om	



Indien er nog problemen, vragen of twijfels zijn, mag je de dokter steeds contacteren.

Je mag ook steeds contact opnemen met de afdeling kinder- en jeugdgeneeskunde op het nummer: **011 71 53 30**

Wij wensen je een goede thuiskomst en jouw kind een spoedig herstel toe.