



DAFALGAN GEBRUIK[Ⓢ] TIJDENS UW OPNAME

Omdat we op de PAAZ vaak werken met mensen die lijden aan een verslavingsproblematiek of met mensen die reeds verschillende geneesmiddelen nemen, is Dafalgan[®] bij ons niet vrij verkrijgbaar. Dafalgan[®] wordt op onze afdeling enkel gegeven op voorschrift van de arts. Ieder meegebracht geneesmiddel dient bij het begin van de opname aan de verpleging te worden bezorgd. Dus ook Dafalgan[®] of andere vrij verkrijgbare medicatie, net zoals vitaminepreparaten of zalven geeft u aan de verpleging tot bij uw ontslag. Wanneer u tijdens het weekend thuis verblijft, is het eveneens de afspraak dat zolang u in opname bent, u thuis geen extra medicatie bijneemt. Dit brengt uw veiligheid of uw opname in het gedrang. In dit ziekenhuis hechten wij veel belang aan veiligheid en communicatie. Wanneer u vragen heeft over uw medicatie of andere producten die u wenst te nemen, kan u dit best bespreken met uw arts.

VRAGEN

Wanneer u vragen heeft betreffende uw behandeling, bespreekt u dit best met uw arts.

Contactgegevens:

Afdelingspsychiaters Tel. 011 71 57 00

Dr.Sven Estercam
Dr.Gert Neirinck
Dr.Eva Vansummeren

Hoofdverpleegkundige Tel: 011 71 57 06
Kristof Vandingenen

Algemene contactgegevens PAAZ
Tel: 011 71 57 00
Fax: 011 71 56 77

Publicatie: April 2019, team PAAZ
Sint-Franciscusziekenhuis
P. Paquaylaan 129 - 3550 Heusden-Zolder
Tel.: 011 71 50 00 - Fax.: 011 71 50 01 - www.sfz.be



Dafalgan[Ⓢ]
paracetamol NIET zomaar
een pijnstiller

WAT IS DAFALGAN[®]?

Dafalgan[®] is een merknaam van een pijnstiller op basis van paracetamol. Er bestaan verschillende soorten Dafalgan[®], zoals tabletten, bruistabletten of smelt - tabletten in doseringen van 500mg tot 1g. Al deze vormen zijn in de apotheek te verkrijgen zonder voorschrift. Er zijn ook pijnstillers op basis van paracetamol in combinatie met een andere pijnstillende stof zoals bijvoorbeeld aspirine of codeïne. Dafalgan Codeïne[®] is enkel op voorschrift verkrijgbaar omdat dit een zwaarder pijnstillend middel is met een risico op verslaving.

WANNEER DAFALGAN[®] GEBRUIKEN?

Dafalgan[®] wordt door een arts voorgeschreven voor pijnstilling of koorts. Het is belangrijk dat u tussen twee innamen minstens 4 uur laat en nooit meer dan 1g gelijktijdig neemt. Dit heeft te maken met de verwerking van de pijnstiller door de lever.

Ondanks dat Dafalgan[®] een bekend en veelgebruikt middel is, is het niet zonder gevaar. Dagelijks gebruik van (veel) paracetamol kan schadelijke gevolgen hebben voor uw nieren of lever. Daarom bedraagt de maximale dosis Dafalgan[®] per dag 4g. Grote hoeveelheden Dafalgan[®] ineens innemen kan ervoor zorgen dat de lever dit moeilijk verwerkt en een vergiftiging optreedt.

Hoewel Dafalgan[®] vrij verkrijgbaar is, is dit nog steeds een geneesmiddel waar voorzichtig mee moet worden omgesprongen.

WANNEER DAFALGAN[®] VERMIJDEN?

Als u lijdt aan een aandoening van de nieren of lever kan u het gebruik van Dafalgan[®] best tot een minimum beperken, met een maximum van 3g Dafalgan[®] per dag. Het gebruik van Dafalgan[®] in combinatie met kalmeermiddelen, middelen tegen epilepsie en alcohol dient met uw arts besproken te worden. Bij een zoutarm dieet, kan u best geen Dafalgan[®] bruistabletten gebruiken omdat deze zout bevatten. Indien u hier verdere vragen over heeft, kan u deze bij uw behandelend arts stellen.

Dafalgan[®] en alcoholgebruik.

De combinatie van pijnstillers en alcohol is af te raden. Zowel overmatig alcoholgebruik als het gebruik van alcohol op geregelde basis, kunnen lijden tot beschadiging van de lever.