

Radiologie: Colon

Wat?

Het is een onderzoek waarbij de binnenkant van de dikke darm zichtbaar wordt gemaakt met behulp van een contrastmiddel (barium) en lucht.

Vorbereiding:

Dit onderzoek gebeurt enkel op afspraak.

Om goede röntgenbeelden te maken mogen er geen voedselresten meer in de darmen zitten. Het is daarom zeer belangrijk dat u zich aan de voorgeschreven voorbereiding houdt, anders loopt u het risico nogmaals voor hetzelfde onderzoek terug te moeten komen.

De voorbereiding begint 2 dagen voor het onderzoek en bestaat uit het gebruik van laxeermiddelen en het volgen van een restenarm dieet. De avond voor het onderzoek drinkt u Prepacol opgelost in water en neemt de 4 bijhorende laxeertabletten. Een onderdeel van het dieet is dat u veel drinkt, dit bevordert het grondig reinigen van de darmen. Deze voorbereiding veroorzaakt herhaaldelijk diarree. De dag voor het onderzoek blijft u vanaf 24 uur nuchter = niet eten, drinken, roken of medicatie innemen.

**!!! Indien u (mogelijk) zwanger bent,
moet dit voor het onderzoek gemeld worden !!!**



Verloop van het onderzoek:

De verpleegkundige geeft u richtlijnen over welke kledij en juwelen u moet uitdoen en bezorgt u een aangepast schortje. De radioloog brengt via een canule in de anus de bariumpap in de dikke darm en brengt vervolgens met een pompje lucht in. Het inbrengen van de sonde doet géén pijn. Mogelijks voelt u darmkrampen, deze zijn van tijdelijke aard en verminderen bij diep in- en uitademen. Terwijl u op de onderzoekstafel ligt, zal de radioloog u vragen een aantal keren te draaien. Op die manier kan de darm van verschillende kanten worden bekeken. Via de monitor beoordeelt de radioloog de verschillende posities waarin de röntgenbeelden gemaakt worden.

Hij vraagt u dan om de adem even in te houden. Aan het eind van het onderzoek wordt de sonde verwijderd en mag u rustig naar het toilet gaan.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

De dagen na het onderzoek kan de stoelgang wit kleuren. Het is aangewezen om veel water te drinken na het onderzoek. Indien u snel last hebt van obstipatie, kan u eventueel aan de aanvragende arts een laxeermiddel vragen.

Dienst Radiologie Sint-Franciscusziekenhuis | Tel. 011 71 55 29
Dienst Radiologie Medisch Centrum Beringen | Tel. 011 71 56 10

