

Radiologie:

Colo-Cysto-Defaecografie

Wat?

Colpo-cysto-defaecografie is een onderzoek waarbij zowel het eerste deel van de dikke darm (rectum), de blaas als de vagina gevuld wordt met een contrastproduct met als oogmerk een verzakking aan te tonen.

Vorbereiding:

Dit onderzoek gebeurt enkel op afspraak en vraagt geen specifieke voorbereiding.

Het betreft een onderzoek met een contrastproduct, waardoor het héél belangrijk is vooraf goed te melden of u allergisch bent voor contraststoffen, aardbeien of mosselen.


!!! Indien u (mogelijk) zwanger bent, moet dit voor het onderzoek gemeld worden !!!

Verloop van het onderzoek:

De verpleegkundige geeft u richtlijnen over welke kledij en juwelen u moet uitdoen en bezorgt u een aangepast schortje.

Het eerste deel van het onderzoek bestaat uit het toedienen van het contrastproduct :

- De blaas wordt gevuld met een jodiumhoudend contrastproduct door middel van een blaassonde.
- Het eerste deel van de dikke darm wordt met behulp van een rectale sonde gevuld met vaste bariumpap.
- De vagina wordt ook met behulp van een sonde gevuld met een bariumplossing.



Wanneer alle contraststoffen zijn ingebracht, mag de patiënte op de linkerzijde gaan liggen met een meetlatje tussen de benen. Dan worden er foto's genomen in ontspannen toestand, tijdens het persen en tenslotte tijdens het drukken.

Tijdens de RX-opnamen mag u niet ademen of niet bewegen. Daarna worden alle sondes verwijderd en wordt de tafel verticaal gekanteld. U neemt zijdelings plaats op de nachtemmer en de drie bovengenoemde opnamen worden nog eens herhaald.

Het onderzoek is niet pijnlijk, enkel ongemakkelijk en duurt ongeveer 30 minuten.

Om alle contraststoffen goed te verwijderen, wordt aangeraden na het onderzoek zoveel mogelijk te drinken. Witte stoelgang is mogelijk.

Dienst Radiologie Sint-Franciscusziekenhuis | Tel. 011 71 55 29
Dienst Radiologie Medisch Centrum Beringen | Tel. 011 71 56 10

