

## MOGELIJKE RISICO'S & COMPLICATIES

Uitzonderlijk kan je:

- een allergische reactie vertonen (zoals papels, huiduitslag, ademhalingsmoeilijkheden, jeuk, misselijkheid).  
Je neemt dan best contact op met je huisarts of de dienst spoedgevallen.
- mogelijk kan je een blaasontsteking oplopen.  
Contacteer dan je huisarts.

## VRAGEN OF PROBLEMEN?

Wanneer je na het onderzoek vragen hebt, stel je ze best onmiddellijk na afloop ervan. Heb je bij thuiskomst nog ongemakken of vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren via ons secretariaat.

**Secretariaat radiologie: 011 71 55 29**

**Radiologen:**

Dr. Jurgen Wathiong  
Dr. Johan Augustinus  
Dr. Werner Wouters  
Dr. Kathleen Weemaes  
Dr. An Boets  
Dr. Jo vandersmissen  
Dr. Christoph Kenis

Publicatiedatum: Maart 2020, Team Medische Beeldvorming  
Sint-Franciscusziekenhuis  
P. Paquaylaan 129 - 3550 Heusden-Zolder  
Tel.: 011 71 50 00 - Fax.: 011 71 50 01 - [www.sfz.be](http://www.sfz.be)



**Colpocystodefaecografie**  
[CCD]

## WAT IS EEN COLPOCYSTODEFAECOGRAFIE

Een colpocystodefaecografie is een onderzoek waarbij zowel het laatste deel van de dikke darm (rectum), de blaas als de vagina gevuld worden met een contrastproduct met de bedoeling de functie van de bekkenbodem te beoordelen.

## VOORBEREIDING

Dit onderzoek gebeurt enkel op afspraak. Je hoeft géén specifieke voorbereiding te volgen. Indien je recent een ander contrastonderzoek ondergaan hebt, moet je dit vooraf melden.

Ook indien je (mogelijk) zwanger bent, moet je dit voor het onderzoek melden!

## HET ONDERZOEK

De verpleegkundige geeft je richtlijnen over welke kledij en juwelen je moet uitdoen en bezorgt je een aangepast schortje. Het eerste deel van het onderzoek bestaat uit het toedienen van het contrastproduct:

- Je dient 1 uur voor het onderzoek aanwezig te zijn om bariumpap te drinken om de dunne darm aan te kleuren.
- De blaas wordt gevuld met een jodiumhoudend contrastproduct, dit door middel van een blaassonde.
- Het laatste deel van de dikke darm wordt met behulp van een sonde via de anus gevuld met vaste bariumpap.
- De vagina wordt eveneens via een fijne sonde gevuld met een bariumoplossing.

Indien alle contraststoffen zijn ingebracht in de 3 lichaamsholten, mag je op de linkerzijde gaan liggen. Dan worden er radiografie-opnamen genomen in drie condities:

- in rusttoestand,
- tijdens het hard dichtknijpen van de bilspieren en
- tijdens het persen.

Tijdens de RX-opnamen mag je niet ademen of bewegen. Daarna worden alle sondes verwijderd en wordt de tafel verticaal gekanteld. Je neemt zijdelings plaats op de toiletstoel en de 3 bovengenoemde opnamen worden nog eens herhaald. Daarna wordt gevraagd om je volledig te ontlasten (alles uitduwen) en te plassen. Het onderzoek is niet pijnlijk, enkel ongemakkelijk en duurt in totaal ongeveer 1u30 (inclusief één uur vooraf drinken).

## NA HET ONDERZOEK

Na het onderzoek mag je onmiddellijk naar het toilet gaan. Omwille van de bariumpap zal de stoelgang aanvankelijk wit kleuren. Om eventuele constipatie en blaasontsteking te voorkomen, is het raadzaam om minimum 2 liter water te drinken. Mogelijk kan er gedurende een tweetal dagen vaginaal verlies van bariumcontrast optreden.

Indien je nadien nog veel hinder ondervindt, neem je best contact op met je huisarts. Na het onderzoek mag je eten en drinken tenzij er nog een ander onderzoek moet gebeuren waarbij je nuchter moet blijven. Meestal kan je je dagelijkse activiteiten onmiddellijk hervatten.

Het resultaat van het onderzoek is de volgende werkdag beschikbaar bij jouw aanvragende arts of specialist.