

Chirurgisch Dagziekenhuis: Uretheroscopie

Geachte

U gaat vandaag naar huis, nadat door middel van een kijkoperatie, een steen in de urineleider via de plasbuis werd verwijderd.


Om de urineleider zelf goed te laten genezen, kan het zijn dat er een stent werd geplaatst. Dit is een buisje dat inwendig zit tussen de nier en de blaas, in de urinebuis (de zogenaamde ureter). Deze stent blijft, afhankelijk vanwaar de steen oorspronkelijk zat, twee tot vier weken ter plaatse.

Van het buisje kunt u last hebben bij het plassen. Tijdens het plassen zelf kan u een drukkend gevoel in de zij ervaren omdat er tijdens het plassen wat water terug naar de nier loopt. Na enkele minuten gaat dit spontaan weer over. Ook kan u het gevoel hebben dat u dikwijls moet plassen. Dit is het gevolg van de aanwezigheid van het buisje in de urinebuis. Ook dit is volkomen normaal. Een beetje bloed bij de urine kan zolang het buisje aanwezig is voorkomen.

De stent wordt verwijderd op de consultatie. Dit gebeurt met onze cystoscoop, de camera waarmee we in de blaas kunnen kijken.

Enkele aandachtspunten:

- * Best kan u voldoende drinken. Eet de dag van de ingreep iets licht verteerbaar. Gebruik geen alcohol de eerste 24u na de narcose.
- * Regelmatig kan u nog wat bloedverlies in de urine waarnemen. Indien dit te uitgesproken is, neemt u best contact op met uw huisarts.

- 
- * Vaker plassen is een normaal verschijnsel gedurende de eerste dagen.
 - * Indien u nog pijnklachten heeft, kan u Dafalgan (3x 1g/dag) of Brufen (3x 400mg/dag) innemen.

Er wordt een controle-afspraak voor u gemaakt indien nodig.

Ons team wenst u een spoedig herstel.

Mocht er zich toch een probleem voordoen of heeft u vragen, neem dan gerust contact op met uw huisarts of met ons secretariaat.

Contactgegevens:

Artsen:

Dr. Dilen Kurt
Dr. Stragier Jo
Dr. Tuytten Tom

De urologieverpleegkundigen: Tel. 011 71 58 22

Secretariaat urologie: Tel. 011 71 58 10

